

CASA DI CURA " Villa Maria "
Mirabella Eclano (AV)
Tel. 0825/449797 – 449068
Fax 0825/407348

Servizio di fisiopatologia dell'apparato digerente
FOGLIO INFORMATIVO E RICHIESTA DI CONSENSO ALLA
pH-impedenziometria delle 24 ore

Data:

L'Impedenziometria - ph-metria esofagea è un esame che consente di valutare la presenza di reflussi gastro-esofagei acidi e non-acidi nell'arco di 24 ore e l'eventuale correlazione tra il reflusso ed i sintomi. L'esame viene eseguito al mattino, ed il paziente deve essere a digiuno quando raggiunge l'ambulatorio. L'importanza di avere questi dati aggiuntivi è legata a recenti conoscenze secondo le quali una parte dei pazienti con malattia da reflusso gastroesofageo percepisce sintomi durante episodi di reflusso indipendentemente dall'acidità del liquido che refluisce.

L'esame consiste nell'introduzione di un piccolo sondino sterile e morbido attraverso una narice e nel suo posizionamento nell'esofago. La parte esterna del sondino, che fuoriesce dalla narice, viene fissata al viso con un cerotto e poi collegata ad un piccolo apparecchio che il paziente porta a tracolla. La registrazione dura 24 ore durante le quali il paziente non ha necessità di rimanere in Ospedale. Vi torna la mattina successiva per la rimozione del sondino. Per ottimizzare le informazioni che l'esame può dare, il paziente deve svolgere, quanto più è possibile, le normali attività quotidiane, seguendo una dieta libera registrando l'eventuale comparsa di sintomi. Durante le 24 ore di registrazione potrebbe verificarsi la comparsa di modesta secrezione acquosa dalla narice in cui è posizionato il sondino (come durante il raffreddore), che regredisce prontamente alla rimozione del sondino stesso.

Devono essere seguite alcune regole in particolare:

- Digiuno dalla sera precedente l'esame o da almeno 8 ore.
- Sospendere 7 gg prima dell'esame farmaci antisecretivi (gastroprotettori a base di pantoprazolo, rabeprazolo, esomeprazolo, lansoprazolo, omeprazolo).
Se la sospensione non è possibile se ne terrà conto alla refertazione.
- Sospendere 3 gg prima dell'esame farmaci procinetici, antiacidi (alginati, sucralfato), H2 antagonisti (a base di ranitidina o famotidina)

Poiché l'introduzione della sonda viene praticata senza visione diretta da parte dell'operatore, è utile avere la conoscenza anamnestica di qualsiasi anomalia anatomica già nota del paziente, eventualmente scoperte tramite precedenti radiografie o endoscopie.

L'esame può essere gravato da rare e non prevedibili complicanze (crisi vagali, con perdita di coscienza, arresto cardiocircolatorio, oppure perforazioni) che in circostanze del tutto eccezionali potrebbero risultare pericolose per la vita e, per le quali comunque, verrebbero prestate tutte le cure possibili.

Al termine dell'esame si può tornare subito a casa. Il medico vi informerà dei risultati dell'esame dopo averli elaborati

Modulo di consenso informato

Con la presente confermo di aver letto e compreso le informazioni riportate nel modulo, e di aver ricevuto spiegazioni esaurienti alle mie domande circa le modalità di svolgimento e le finalità dell'esame pH-impedenziometria. Do pertanto liberamente il mio consenso a sottopormi all'esame.

DATI DEL PAZIENTE:

Firma del/della paziente

.....

Firma dell'operatore

.....