

PREPARAZIONE EsofagoGastroDuodenoScopia

DOCUMENTAZIONE DA PORTARE:

- Emocromo completo, PT, PTT , non oltre tre mesi antecedente l'esame.
- Pazienti oltre 65 aa o cardiopatici Elettrocardiogramma refertato con Nulla Osta cardiologico non oltre tre mesi antecedente l'esame.
- Esami radiografici o endoscopici precedenti. cartelle cliniche di eventuali ricoveri.
- Elenco delle eventuali medicine assunte ed eventuali allergie.

DISPOSIZIONI PER PAZIENTI CON TERAPIA IN CORSO

- Pazienti in terapia con IPP (protezione dello stomaco) sospendere almeno 10 gg prima dell'esecuzione dell'esame.
In caso tale terapia è assunta in maniera cronica (mesi o anni) tale sospensione deve avvenire in maniera graduale con dimezzamento della dose per due settimane; poi per altre due settimane passare ad un cpr a gg alterni; poi si può sospendere ed attendere 1 settimana prima di fare l'esame.
- Pazienti in terapia con farmaci anticoagulanti e/o antiaggregante
 - ✓ Plavix, Ticlopidina, Cardirene e similari: sospensione 7 giorni prima e sostituzione con eparina a basso peso molecolare (Seleparina, Clexane, Fraxiparina, ecc. ecc.)
 - ✓ Coumandin, Sintrom, .: sospensione 6 giorni prima e controllo INR il giorno prima e sostituzione con eparina a basso peso molecolare (Seleparina, Clexane, Fraxiparina, ecc. ecc.)
 - ✓ Xarelto, Elikvis, Pradaxa, .: sospensione 48 ore prima e sostituzione con eparina a basso peso molecolare (Seleparina, Clexane, Fraxiparina, ecc. ecc.)
 - ✓ La **CARDIOASPIRINA** invece può essere mantenuta e assunta regolarmente
- Pazienti diabetici che assumono insulina o altri farmaci devono contattare il medico di medicina generale per eventuale variazione o sospensione della terapia.
- Pazienti in terapie farmacologiche per problemi di ipertensione arteriosa , malattie cardiologiche o respiratorie non devono sospendere la terapia neanche il giorno dell'esame.

PREPARAZIONE PER L'ESAME

- La sera precedente l'esame cena leggera
- La mattina dell'esame digiuno

E' importante venire **SEMPRE** accompagnati : in corso di esame possono essere somministrati sedativi che possono compromettere la guida. Per lo stesso motivo è opportuno che non vengano eseguiti atti che richiedono piena lucidità e capacità di concentrazione nelle 12 ore successive all'esame